

ختنه

بهترین زمان برای ختنه کردن:

بر اساس نظر متخصصین نوزاد، زمان مناسب برای ختنه کردن، از ۶ ساعت پس از تولد تا پیش از ترخیص و یا تا حداکثر پیش از دوره نوزادی (۲۸ روز نخست زندگی) است. مشروط بر اینکه نوزاد سالم و وزن بیش از ۲۵۰۰ گرم داشته باشد. البته بعضی از متخصصین ۳۰ تا ۴۰ روزگی را توصیه میکنند.

موارد منع ختنه :

بیماری های خون ریزی دهنده در خانواده (مانند هموفیلی و...)

اختلالات مجرا (هیپوسپیدیاس، دوگانه بودن مجرا و انحراف محور)

آلت پنهان شده در نوزادان چاق یا میتلا به هدر وسل و فتق بزرگ

نگاه کلی :

ختنه کردن، عمل جراحی کوچکی است که سابقه پنج هزار ساله دارد. در این عمل جراحی کوچک، پوستی که سر آلت را پوشانده است با روش های مختلف دور میکنند تا سر آلت برهنه و آزاد گردد.

روش های مختلف ختنه کردن :

گذاردن حلقه پلاستیکی:

این روش متداول ختنه کردن است. بدین ترتیب که حلقه پلاستیکی را روی نوک آلت قرار میدهند و با نخ، گره میزنند. ۵ تا ۷ روز آن را به همین حالت نگه میدارند. در نتیجه پوست جلو نخ سیاه میشود و با حلقه می افتد. این روش معمولاً قبل از سه ماهگی انجام میشود.

روش بریدن و دوختن :

این روش معمولاً پس از سه ماهگی به کار میرود، اگر از محل ختنه، خون ریزی زیاد باشد، باید سریعاً به پزشک مراجعه کرد تا از خون ریزی جلوگیری نماید. محل ختنه باید با آب و صابون شسته شود و در معرض هوا قرار گیرد.



بیمارستان امام هادی (ع) فراشبند مراقبت های ختنه

تهیه کننده: حمیده کهنسال (کارشناس اتاق عمل)

تایید کننده: دکتر علی تاج الدینی

(متخصص جراح عمومی)

تهیه: بهار ۱۴۰۱

بازنگری: بهار ۱۴۰۴

منبع: اصول جراحی شوارتز

کد: OR-PM-151-02

نشانه های خطر

خونریزی یا تغییر رنگ و تیره شدن نوک آلت و خون مردگی وسیع آلت و بیضه تورم شدید آلت و بیضه (افتادن حلقه کمتر از ۳ روز یا نیفتادن تا ۱۵ روز) اگر حداکثر بیش از ۲۴ ساعت پس از ختنه، ادرار نکرد به پزشک مراجعه شود.

عفونت های محل ختنه (قرمزی یا ترشح چرکین) هر نکته ایی که به نظر والدین غیر طبیعی باشد.

در صورت بروز هر یک از علائم خطر هر چه سریعتر به پزشک مربوطه مراجعه نمایید.

مراقبتهای پس از ختنه :

حداقل نوزاد دو ساعت پس از ختنه تحت نظر باشد.

محل ختنه در چند روز او از آلودگی محافظت شود و در صورت آلودگی با مدفوع، آب و صابون، تمییز شست و شو داده شود.

روی حلقه و آلت روزی سه بار یا بیشتر از پماد تجویز شده استفاده شود.

۷ روز پس از ختنه به پزشک مراجعه شود. در صورت بی قراری از قطره استامینوفن استفاده شود.

پوشک نوزاد حداقل المقدور باز باشد و در صورت بستن، محکم بسته نشود.

تجویز آنتی بیوتیک ضرورتی ندارد.